

العوامل المؤثرة على الذوبانية

1. درجة الحرارة، 2. طبيعة المذيب، 3. الايون المشترك، 4. تاثير القوة الايونية، 5. الدالة الحامضية، 6. طبيعة المذاب، 7. تكوين المعقدات، 8. التحلل المائي، 9. العوامل المؤكسدة والمختزلة، 10. تاثير حجم دقائق المادة المذابة.
- ان العامل الاخير هو:

1. تاثير حجم دقائق المذاب:

ان الكثير من المواد الصلبة تكون ذوبانية بلوراتها الصغيرة اكبر بكثير من ذوبانية بلوراتها الكبيرة.

مثال:

ذوبانية بلورات كبريتات الباريوم ($BaSO_4$) الصغيرة اكبر 1000 مرة من ذوبانية بلوراتها الكبيرة. بينما لا يوجد فرق ملموس في ذوبانية دقائق $AgCl$ الكبيرة والصغيرة.

يمكن الاستفادة من هذه الخاصية في الحصول على راسب ذو بلورات كبيرة ومنتظمة باجراء ما يسمى (بهضم الراسب) وهي عملية ترك الراسب مع المحلول الام لفترة زمنية طويلة بعد تسخينه والغرض هو اتاحة الفرصة لذوبان الدقائق الصغيرة لتتمو على حسابها الدقائق الكبيرة (نضوج الراسب بطريقة أو ستوالد).

2. تاثير درجة الحرارة على الذوبانية:

لغرض فهم العلاقة بين الذوبانية ودرجة الحرارة، يجب فهم ميكانزم عملية الاذابة. فان ذوبان مادة من المواد في مذيب ما، يتطلب امتصاص حرارة لغرض التغلب على قوة الجذب بين جزيئات أو ايونات تلك المادة المذابة الصلبة. أي تتطلب عملية الاذابة امتصاص حرارة للتغلب على قوى الجذب بين الجزيئات والايونات للمادة الصلبة المراد اذابتها.

اما الجزيئات الغير قطبية مثل جزيئة اليود I_2 أو جزيئة كلوريد الجermanيوم $GeCl_4$ فتكون رديئة الذوبان في المذيبات القطبية مثل الماء، لعدم وجود قوى جذب بينها وبين جزيئات الماء. ان ذوبانية هذه الجزيئات تعتمد على التشتت بين جزيئات المذيب، فالماء يعتبر مذيب رديء لمثل هذه الجزيئات، لان جزيئاته ذات قطبية لا تتيح لمثل هذه الجزيئات مثل اليود التشتت بينها.

اما المذيبات غير القطبية مثل رابع كلوريد الكربون CCl_4 تعتبر مذيبات جيدة لمثل هذه الجزيئات، وذلك لان الطاقة بين جزيئات المذيب غير القطبي ضعيفة، لذا يسهل عملية تشتت الجزيئات أو المركبات (مثل اليود) بين جزيئات هذه المذيبات.

كذلك ان الاملاح تنخفض ذوبانيتها في الماء عند اضافة مذيب اخر عضوي يمتزج مع الماء مثل الايثانول أو الاسيتون. وان سبب هذا الانخفاض هو تحطيم الغلاف المائي الذي يغلف الملح من قبل الايثانول أو الاسيتون. مثال كبريتات الرصاص $PbSO_4$ ان ذوبانية الملح هي حوالي 1.5×10^{-4} مول/ليتر وتساوي 45 ملغم في/لتر من الماء. اما اذا استخدمنا مذيب مكون من 30% ماء و 70% ايثانول، فستتخفض الذوبانية إلى 0.09 ملغم/ليتر أي إلى 3×10^{-7} مول/ليتر.

مثال اخر: كبريتات الكالسيوم ذوبانية عالية في الماء ولكن تنخفض بشكل كبير عند استخدام محلول خليط من الماء والكحول أو الماء والاسيتون. حيث تنخفض ذوبانية كبريتات الكالسيوم من 0.208 غم/ 100 غم ماء (وهي ذوبانية عالية) إلى 0.0029 غم/ 100 غم اذا احتوى الماء على 41% ايثانول. لذلك يفضل ترسيب $PbSO_4$ في محيط ماء - ايثانول بدلا من المحيط المائي الخالص (لاغراض التحليلية الكمية الوزنية).

في حالة ملح الطعام $NaCl$ تكون طاقة التميؤ مساوية لطاقة الشبكة البلورية لذلك لا يكون الذوبان مصحوبا بتحرر طاقة أو تغير في درجة حرارة المحلول.

$$\Delta H_{\text{Solu.}} = \sum \Delta H_{\text{Hyd.}} + U_{\text{MA}}$$

طاقة الشبكة البلورية حرارة التميؤ حرارة أو انثالي المحلول

4. طبيعة المذيب:

المذيب القطبي والمذيب غير القطبي

المذيب القطبي: هو المذيب الذي يمتلك عزم ثنائي القطب (دايپول) وله ثابت عزل كهربائي Dielectric Constant كبير نسبياً، مثل الماء، وعكس ذلك المذيب غير القطبي مثل البنزين ورابع كلوريد الكربون. توجد قاعدة تقول أو تنص على أن المذيب يذيب مثيله أو شبيهه فالمذيبات القطبية تكون مذيبات جيدة لكثير من الأملاح الأيونية، وذلك لأن كلما زادت قطبية المذيب كلما ازداد الجذب بينه وبين أيونات الملح. وأن قوى جذب أيونات الملح لبعضها البعض في الشبكة البلورية تتناسب عكسياً مع ثابت العزل للمذيب

$$K = \frac{1}{D} \cdot \frac{e_1 e_2}{r_2}$$

حيث أن:

e_1, e_2 : شحنة الأيونين السالب والموجب

r : المسافة بينهما.

D أو (ϵ) : ثابت خاص بالمذيب يسمى ثابت العزل الكهربائي.

3- طبيعة المادة المذابة:

أن مقدار ذوبانية الأملاح يتوقف على طاقة شبكتها البلورية U_{MA} . وكلما كانت عالية كلما كان الملح شحيح الذوبان، ويتم التغلب على هذه الطاقة U_{MA} لغرض ذوبان بلورات الملح، ويتم التغلب على هذه الطاقة بواسطة حرارة أو اثنا البي التمذوب (أو التميؤ إذا كان المذيب ماء)، الحرارة الناتجة عن اتحاد الوحدات البنائية للبلورة بجزيئات المذيب (أحاطة واتحاد أيونات المذاب بجزيئات الماء).

قانون كرلوم (كولومب):

$$K = \frac{1}{D} \cdot \frac{e_1 e_2}{r_2}$$

حيث:

e_1, e_2 : شحنة كل من الايون السالب والموجب.

r : المسافة بينهما.

D او (ϵ) : ثابت خاص بالمذيب يسمى ثابت العزل الكهربائي.

قانون كولومب:

القوة اللازمة لفصل دقيقتين أو ايونين مختلفين بالشحنة عن بعضها البعض تتناسب طرديا مع حاصل ضرب الشحنات وعكسيا مع مربع المسافة بينهما.

يتضح من ذلك ان الذوبانية: تقل بزيادة شحنة الايون، تزداد بزيادة المسافة أو (نق)، تزداد بزيادة ثابت العزل الكهربائي للمذيب.

ذوبانية املاح القلويات الترابية (مثل املاح الكالسيوم والمغنسيوم) اقل من ذوبانية املاح الفلزات القلوية (مثل املاح الصوديوم والبوتاسيوم).

الماء كمذيب قطبي:

بسبب القطبية التي تمتلكها جزيئات الماء فان لها تاثير مزدوج على الارتباطات الايونية للاملاح (مثل NaCl).

1. بسبب ثابت العزل الكهربائي العالي للماء، فانه يقلل بشكل كبير من قوى التجاذب بين الدقائق المتعاكسة بالشحنة، أي بمعنى اخر يقلل من طاقة الشبكة البلورية ويساعد على هدم الشبكة.

2. عند انفصال أي دقيقة ايونية من الشبكة تحاط فورا بجزيئات الماء وتنمياً. اما توجه اقطاب (دايبولات) جزيئات الماء فستتوقف على شحنة الايونات المنفصلة عن الشبكة الايونية.



وبصورة عامة فالاملاح التي فيها تكافؤ الكاتيون مساويا لتكافؤ الأنيون فان:




5. تأثير الايون المشترك: Common Ion Effect

حسب قاعدة ليه شاتليه: تقل أو تنخفض ذوبانية الرواسب أو الاملاح في محلول يحتوي على ايون مشترك مع ايونات الراسب.

مثال:

تقل ذوبانية AgCl عند وجود زيادة من ايونات Cl^- أو Ag^+ في المحلول، ذلك لان الجزء الذائب من كلوريد الفضة يكون في توازن مع الجزء الصلب من جهة ومن جهة اخرى فهو يتفكك إلى ايونات الكلوريد وايونات الفضة كما يلي:




تفكك ذائب صلب

يخضع هذا التفكك لحالة توازن فاذا اضيفت زيادة من ايونات Cl^- إلى هذا النظام المتوازن سيختل التوازن، ولجل اعادة التوازن يخرق التفاعل باتجاه اليسار أي لصالح تكوين الراسب.

مثال (1):

اذا كان حاصل اذابة كلوريد الفضة هو 1.08×10^{-10} احسب ذوبانية الراسب في ليتر من الماء المقطر ثم احسبها اذا كان المحلول يحتوي زيادة من ايونات الكلوريد قدرها 0.01 مولاري.

الحل:



X X

$$K_{sp} = [Ag^+] [Cl^-]$$


$$X = [Cl^-] = [Ag^+]$$

$$K_{sp} = X^2$$

$$1.08 \times 10^{-10} = X^2$$

$$\therefore X = \sqrt{1.08 \times 10^{-10}} = 10^{-5} \text{ mole/L} = [Cl^-] = [Ag^+]$$

الذوبانية



X X

$$[Ag^+] = X \quad 0.01$$

$$[\text{Cl}^-] = X + 0.01$$

تُهمل

$$K_{sp} = [\text{Ag}^+] [\text{Cl}^-]$$

$$1.08 \times 10^{-10} = X \cdot (X + 0.01)$$

$$1.08 \times 10^{-10} = X \cdot 0.01$$


$$\therefore x = \frac{1.08 \times 10^{-10}}{0.01} = 10^{-8} \text{ mole/L}$$

أي ان الذوبانية انخفضت بحدود الف مرة.

مثال (2):

احسب عدد الملغرامات من يوديد الفضة التي يمكن اذابتها في 1000 مل من الماء المقطر. ثم احسب عدد المليغرامات التي يمكن ان تذوب في 100 مل من محلول 0.1 مولاري يوديد الصوديوم، علما ان حاصل اذابة يوديد الفضة = 1×10^{-16} وان وزن صيغته هي 234.77.

الحل:



$$K_{sp} = [\text{Ag}^+] [\text{I}^-]$$

$$1 \times 10^{-16} = X \cdot X$$

$$1 \times 10^{-16} = X^2$$

$$\therefore X = \sqrt{1 \times 10^{-16}} = 10^{-8} \text{ mole/L}$$

$$S = 10^{-8} \times 234.77 \text{ (غم/ لتر)}$$


$$= 2.3477 \times 10^{-6} \text{ gm/L} = 235 \times 10^{-8}$$

$$\frac{2.3477 \times 10^{-6} \times 100}{1000} \quad 2.347 \times 10^{-7} \text{ gm/100 ml}$$

$$235 \times 10^{-9}$$

$$2.347 \times 10^{-7} \times 1000 = 2.3477 \times 10^{-4} \text{ mg/ 100 ml}$$

$$= 235 \times 10^{-6}$$



0.1 common Ion





$$\begin{aligned}
[\text{Ag}^+] &= X \\
[\text{I}^-] &= X + 0.1 \\
K_{sp} &= [\text{Ag}^+][\text{I}^-] \\
&= X \cdot (X + 0.1) \\
1 \times 10^{-16} &= X \cdot 0.1 \\
\therefore X &= \frac{1 \times 10^{-16}}{0.1} \\
&= 10^{-15} \text{ mole/L} \\
X &= \frac{10^{-15} \times 234.77 \times 100}{1000} \\
&= 2.345 \times 10^{-14} \\
&= 235 \times 10^{-16} \text{ gm/100ml} \\
&= 235 \times 10^{-16} \times 1000 \\
&= 235 \times 10^{-13} \text{ mg/ 100 ml}
\end{aligned}$$

وهنا الرقم يدل ان الذوبانية انخفضت اكثر من مليون مرة بسبب وجود ايون اليود المشترك في المحلول.

مثال (3):


احسب مقدار ذوبانية يودات الباريوم بالليتر في محلول 0.02 مولاري من KIO_3 علما بان حاصل اذابة يودات الباريوم 1.57×10^{-9}
الحل:



$$\begin{aligned}
K_{sp} &= [\text{Ba}^{2+}][\text{IO}_3^-]^2 \\
&= X \cdot (2x + 0.02)^2 \\
1.57 \times 10^{-9} &= X \cdot (0.02)^2 \\
1.57 \times 10^{-9} &= X \cdot 4 \times 10^{-4} \\
\therefore X &= \frac{1.57 \times 10^{-9}}{4 \times 10^{-4}} \\
&= 3.925 \times 10^{-6} \text{ mole/ L}
\end{aligned}$$

سؤال:

احسب ذوبانية يودات الباريوم في الماء المقطر وقارنها مع هذا الرقم



$$K_{sp} = [\text{Ba}^{2+}][\text{IO}_3^-]^2$$
$$= X \cdot (2X)^2$$

$$1.57 \times 10^{-9} = 4X^3$$

$$X^3 = \frac{1.57 \times 10^{-9}}{4}$$

$$X^3 = 3.925 \times 10^{-10}$$


$$X = 7.32 \times 10^{-4} \text{ mole/L}$$

تأثير القوة الأيونية للمحلول:

تزداد ذوبانية الرواسب بصورة عامة في المحاليل الألكتروليتية التي تحوي أيونات غريبة عن الذوبانية في الماء الخالص، والسبب هو تعرض أيونات المذاب أو الراسب إلى الجذب من قبل أيونات الألكتروليت مما يؤدي إلى انحراف التوازن نحو اليمين.

إن تأثير تركيز الألكتروليت على الذوبانية يكمن في زيادة جذب أيونات المذاب من قبل الألكتروليت المذاب في المحلول. هذا الجذب يؤدي إلى ازاحة أو انحراف في اتجاه التوازن الكيميائي.

فراسب كبريتات الباريوم BaSO_4 تزداد ذوبانية إلى الضعف عند زيادة تركيز نترات البوتاسيوم من الصفر إلى (0.02F).



هذا الشكل يبين مدى تأثير التراكيز المختلفة لنترات البوتاسيوم على ذوبانية كل من كبريتات الباريوم وكلوريد الفضة ويودات الباريوم. يتبين ان التأثير اقل في راسب يودات الباريوم وراسب كلوريد الفضة، حيث الزيادة في ذوبانية الراسب حوالي 1.25 مرة وفي ذوبانية (AgCl) الثاني 1.2 مرة.

ونرى ان هذا التأثير لا يقتصر على ذوبانية الرواسب فقط، بل لوحظ انه يشمل انواع اخرى من التوازنات. فمثلا ان ثابت تفكك حامض الخليك يختلف في محلول كلوريد الصوديوم عنه في الماء الخالص.

حيث يزداد ثابت التفكك بمقدار الضعف بزيادة تركيز كلوريد الصوديوم من الصفر إلى F1.01 لنفس الاسباب السابقة.

وهذا يعني ان قانون التوازن الكيميائي محدد ونافذ بصورة دقيقة فقط في حالة المحاليل المخففة وعدم وجود الكتروليت متاين بتركيز ذا أهمية تذكر.

ملاحظات حول تأثير الالكتروليت على الذوبانية:


1. يزداد تأثير ايونات الالكتروليت كلما زادت الشحنات الكهربائية على الايونات المتفاعلة.

مثال:



هنا نجد ان تأثير وجود كمية معتدلة من نترات البوتاسيوم KNO₃ على

الراسب BaSO₄ اكبر من تأثيره على راسب AgCl.



حيث ان التوازن في المعادلة الاولى ينحرف اكثر نحو اليمين من التوازن في المعادلة الثانية.

2. ان التأثيرات لا تعتمد على نوع الالكترونات وانما على ما يسمى (القوة الايونية) للمحلول والتي تعتمد على تركيز وتكافؤ الايونات: وان القوة الايونية تساوي نصف مجموع حاصل ضرب التركيز المولاري لكل ايون مضروب في شحنته أي:

$$\mu = \sum \frac{CZ^2}{2}$$

$$= \frac{1}{2} \sum CZ^2$$

حيث:

μ : هي القوة الايونية للمحلول.

C: تركيز كل ايون من الايونات.


Z: شحنة ذلك الايون.

مثال (1):

احسب القوة الايونية (0.1M لمحلول) من نترات البوتاسيوم و 0.1M محلول

.Na₂SO₄

الحل:




لمحلول: KNO₃

$$[K^+] = 0.1M, \quad [NO_3^-] = 0.1M$$

$$\mu = \frac{1}{2} \sum CZ^2$$

$$= \frac{1}{2} (0.1 \times 1^2 + 0.1 \times 1^2) = 0.1$$

اما المحلول Na₂SO₄:





$$[Na^+] = 2 \times 0.1 = 0.2M$$

$$[SO_4^-] = 0.1M$$

$$\mu = \frac{1}{2} (0.2 \times 1^2 + 0.1 \times -2^2) = 0.3$$

مثال (2):

احسب القوة الايونية لمحلول يحوي على 0.05M نيترات البوتاسيوم و 0.1M كبريتات الصوديوم.



الحل:

$$\mu = \frac{1}{2} \sum CZ^2$$

$$\mu = \frac{1}{2} (0.05 \times 1^2 + 0.05 \times 1^2 + 0.2 \times 1^2 + 0.1 \times -2^2) = 0.35$$