


فسيولوجيا التدريب الرياضي

Athletic Physiology Training



- مفهوم الخلية (تركيبها و وظائفها)
- الخلية cell
- أشكال و حجوم الخلايا
- تركيب الخلية و محتوياتها
- جدار الخلية
- الغشاء البلازمى
- الاهداف والاسواع
- النواة
- السايتوبلازم
- المحتويات الحية فى السايتوبلازم
- المحتويات غير الحية فى السايتوبلازم
- الفجوات الخلوية

إعداد : أ.م.د عبير داخل حاتم
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات
جامعة بغداد

2025-2024

abeer@copew.uobaghdad.edu.iq

المحاضرة : الثانية

مفهوم الخلية (تركيبها ووظائفها)

الخلية cell

هي الوحدة البنائية والوظيفية لجسم الكائن الحي وت تكون من كتله بروتوبلازمية حية تحتوي على نواه وسايتو بلازم يحاط كل منها بغشاء والخلية معقدة التركيب وهذا يتتيح لها حدوث مئات التفاعلات الكيمياوية في حيز الخلية الضيق ويتم ذلك بشكل لا يؤثر احداها على الاخر لصالح عمل الخلية وعند انعدام الانسجام والترابط بين فعاليات الخلية تتحطم وتموت .

اشكال وحجوم الخلايا

تختلف وظائف الخلايا وطريقه تجمعها مع بعضها لذلك تختلف اشكالها وحجومها غالبا ما تكون احجام الخلايا صغيره جدا لا ترى بالعين المجرده بالمجهر كالخلايا العصبية والعضلية في جسم الانسان وقد تكون صغيره الحجم ولكن يمكن رؤيتها بالعين المجردة مثل بيوض الاسماك .

تتخذ الخلايا اشكال متعدده نجميه الشكل كما في الخلايا العصبيه او مغزليه كما في العضلات او كرويه كما في بيوض الحيوانات او متغيره الشكل كما في كريات الدم البيضاء .

تركيب الخلية و محتواها

- رغم تعدد اشكال وحجوم الخلايا واختلاف وظائفها الا انها ذات اساسيات تركيبية واحدة ولا يمكن اعتماد تركيب الخلايا باختيار أي خلية نباتية أو حيوانية او غيرها واعتبارها خلية نموذجية وقد تحتوي الخلية على تركيب او اخر لا يوجد في خلية اخرى وعموما تتكون الخلية من كتله بروتوبلازمية التي تمثل الاساس الطبيعي للحياة محاطه بغشاء وتحتوي على شبكة من القنوات تتخلل السيتوبلازم ..والبروتوبلازم ماده عديمه اللون شفافه اكثر كثافه من الماء ويدخل في تركيبها بنسبة تصل الى 70-80% وما تبقى مواد بروتونية وكربوهيدراتية ودهون واملاح وتتغير سيوله البروتوبلازم بتأثير الحرارة والعوامل الاجنبية ويتألف بروتوبلازم الخلية من جزئين رئيسيين هما السيتوبلازم(Sytoplasm) والنواه
- ويحاط بالسيتوبلازم غشاء رقيق يسمى الغشاء البلازمي وتفصل هذه الاغشيه بين اجزاء الخلية المختلفه وتحدث بعض التفاعلات على سطوح هذه الاغشيه حيث تلتتصق بها الانزيمات المشتركه في التفاعلات .
- ان التراكيب الخلوية العديده تقوم بوظائف معينة متخصصة ومعقدة وتدعى العضيات (organelles)
- وفيما يلى وصف لتركيب ووظائف خلية عامه تحتوي على جميع المكونات في الكائنات الحية :

وصف لتركيب الخلية

• جدار الخلية **cell wall**

يحيط الخلية جدار يفصلها عن المحيط الخارجي ويحافظ على شكلها المورفولوجي وكيانها الوظيفي حيث يبقى ماده البروتوبلازم محافظه على تركيبها ويكون جدار الخلية صلب وي تكون غالباً من السيليلوز (كمافي الخلايا النباتيه) .

• غشاء الخلية **cell membrane**

هو غشاء رقيق جدا سمكه حوالي 0.07 ميكرومتر يتكون من مواد دهنية فوسفاتية وكميات قليلة من الكلولسترول و كذلك مواد بروتينية بنسبة عالية (50 - 70 %) معظمها انزيمات لها علاقة بعبور المواد خلال الغشاء ثم بعض السكريات ، و للغشاء خواص نفاذية حيث يحوى على ثقوب دقيقة جدا تمر خلالها جزيئات الماء والأيونات و يحيط الغشاء البلازمى بمحتويات الخلية و يقوم بتنظيم عملية مرور المحاليل الكيميائية و الماء من و الى الخلية و يمثل الغشاء الخلوي الحدود الخارجية للخلية .

الوظائف الأساسية لغشاء الخلية

- تحديد شكل الخلية و فصل مكوناتها
- التماس مع أسطح الخلايا الأخرى
- تزويد الخلايا بمستقبلات لمواد كيميائية (الهرمونات و الأنزيمات و الأجسام المضادة)
- ضبط خروج و دخول المواد من و إلى الخلية و يعد الغشاء الخلوي انتقائى النفاذية .
- فد تحمل أسطح الغشاء الخلوي نتوءات دقيقة **microvilli**
- تساعد فى زيادة سطح مساحة النسيج المعنى بعمليات الامتصاص أو النقل .
- أو اهدابا **cilla** تساعد فى تحريك المواد على اسطح الخلايا كما فى بطانه المجرى التنفسى او اسواطا **flagellum** تساهمن فى تحريك الخلايا كما فى الحيوانات المنوية .

الاهداب

flagella او microvilli

- وهى امتدادات لغشاء الخلية وهى ليست عامة الوجود فى جميع الخلايا ولكن بعض الخلايا تحتوى عليها كالخلايا المخاطية المبطنة للمجاري التنفسية واقنیه الاذن الداخلية وقنوات الصفراء .
- لها تركيب متشابه فهى تحتوى على تسعه الياف مزدوجة من الخارج اضافه الى زوج واحد فى الوسط كما توجد عند قاعده كل هدب او سوط جسم فاتح اللون يدعى بالحببيه القاعديه (basal grounnule) .

النواة Nucleus

- هى كتله بروتوبلازميه اكثراً كثافه من السيتوبلام وتظهر تحت المجهر الضوئي بشكل جسم كروي او كلوى غير منظم تقع وسط الخلية او فى حافتها وتوجد فى الخلية عاده نواه واحد او اكثراً وتعد النواه مركز السيطره فى صنع المواد المختلفه فى السيتوبلازم بالإضافة الى دورها فى نقل الصفات الوراثيه من جيل الى اخر وهناك توازن بين النواه والسيتوبلازم ولا يمكن لاحدهما الاستغناء عن الاخر.
- توجد في النواه كتله مكونه كثيفه حبيبيه تدعى النويه nucleolus

- وخيوط رقيقه كروماتينيه تسبح في السائل النووي ويحيط بالنواه غشاء ذو طبقتين . تتالف النويه من (RNA) بصورة رئيسية اما الخيوط الكروماتينيه تكون من الكروموسومات وتتألف من (DNA) وبعض البروتينات القاعديه . توجد في السائل النووي مواد ذاتيه مثل البروتينات والاحماض الامينيه ومواد اوليه لصنع الاحماض النوويه اضافه الى الاملاح والانزيمات الضوريه لصناعه ال DNA و RNA

- ان اكثراً البروتينات تشارك في صنع الاحماض النوويه بالإضافة الى الانزيمات المشتركه في التنفس اللاهوائي للخلية والنواه حالياً تقريباً من الانزيمات التنفسية الهوائية اما الغشاء النووي يحمل عده ثقوب التي لها دور في نقل المواد من الخلية الى السيتوبلازم .

السيتوبلازم cytoplasm

هو الجزء المحصور بين غشاء الخلية والنواه ويحوي على المحتويات الحية وغير الحية في الخلية:
المحتويات الحية وتشمل ما ياتى:

الشبكة البلازمية Endoplasmic reticulum

تظهر في السيتوبلازم بشكل شبكة من الأقنيه الغشائية المزدوجة تصل الغشاء البلازمي بالنواه ومن الفجوات المتصلة مع بعضها وتختلف اقطارها حسب الحاله الوظيفيه ونوع الخلايا وغالباً ما تكون موازيه لبعضها مكونه شبكة شبه دوائر حول النواه ومحاطه هذه الأقنيه بغشاء له نفس التركيب الاساسي للغشاء البلازمي وهذه الااغشيه تقسم السيتوبلازم الى ماده محصوره داخل الأقنيه والفجوات وماده خارجها تدعى الهيلوبلازم وتحتوى الااغشيه الاندوبلازميه على انزيمات تقوم ببناء الكلاكوجين وصنع الكوليسترول والمواد الشحميه .

وظائف الشبكة الاندروبلازمية

توفير سطوح لالتصاق بالانزيمات المشتركه في فعاليات الخلية
تشترك في صنع وتمثيل المواد المختلفه كالدهون
نقل المواد من اعمق الخلية الى السطح والعكس
تكون سطوح اغشيتها محل االتصاق الرايبوسومات
تقوم بعض اجزائها بنقل التغيرات الكهربائيه من الغشاء البلازمي الى اعمق الليف العضلي حيث توجد الليفات التي تقوم بعملية التقلص العضلي .

الريبوسومات

- وهي تركيب دقيق توجد في الغالب على بعض أغشية الشبكة البلازمية الداخلية وتعد مركزاً لبناء المواد البروتينية داخل الخلية وتكون على شكل جسيمات كروية كثيرة العدد تلتصق بالسطح الخارجي للشبكة الاندوبلازمية وتعطى مظهاً خشن لا غشيه هذه الشبكة وبعضها في الهيلوبلازم مختلف اعدادها من نوع إلى آخر في الخلايا ودرجة فعاليه الخلية وتكون كثيرة في الخلايا الافرازية (secretary).
- الريبوسومات غنية بالحامض النووي الريبيوزي حيث تحتوى على (50-60%) من الكمية الكلية لهذه المادة في الخلية في حين تشكل هذه (15-20%) من كتلته الخلية . والريبوسومات محبة للاقاعديه لاحتوائهما الحامض النووي RNA وكذلك تحتوى على مواد بروتينية ودهنية وهي مكان صنع البروتين في الخلية .

بيوت الطاقة

المايتوكوندريا (بيوت الطاقة) (mitochondria)

• هى اجسام كرويه او بيضويه او خيطيه تتباين كثيرا في القطر والطول ويعتمد ذلك على الحاله الوظيفيه للخلية ويبلغ طولها (5-1) ميكرومتر وسمكها (0.5) ميكرومتر وعدها في الخلية الواحده يصل الى بعض مئات وهناك علاقه موجبه بين عدد المايتوكوندريا وفاعليه الخلية لانها تحوى على الانزيمات التنفسيه التي تقوم باكسده المواد الغذائيه لتحرير الطاقه (الذلك سميت ببيوت الطاقة).

• وتوجد مغموره فى السايتوبلازم بشكل تراكيب صغيره تشبه حبات القمح او القطبان وتتجمع احيانا حول النواه و تتجمع بالقرب من الوصلات العصبيه (synapses) في الخلايا العصبيه وبالقرب من قاعده الخلية المفرزه وذلك لاحتواها على الانزيمات الضروريه لتحرير الطاقه مهمه فى حدوث الفعالities الحيويه لنقل الحافز العصبى وصنع وافراز المواد , يحيط المايتوكوندريا جدار يتالف من غشائين يمتد الغشاء الداخلى على شكل صفائح , وتحتوى على مواد الطاقه اللازمه للخلية كالمواد الزلاليه الذائبه والكلاكوجين والمواد الدهنيه و الفوسفور وغيرها .

وت تكون المايتوكوندريا من :

• 65-70% بروتينات ، 25-30% ليبيدات (دهون)، 5% كميات قليله من RNA

• و معظم بروتيناتها هي انزيمات تشتراك في عملية التنفس الهوائي (earobic respiration) المستخرجه من سكريات الخلية .

• ان اكثر من 90% من الطاقه التي تستخدمنها الخلايا مصدرها التنفس الهوائي وبما ان الانزيمات الضروريه لحدث هذه العملية موجوده في المايتوكوندريا لذا سميت ببيوت الطاقه للخلية (power houses of the cells)

جهاز كولجي golgi apparatus

هو جهاز افرازى يختلف في الشكل والحجم من خلية إلى أخرى يقع قرب النواه يكون بشكل طبقات لاكياس محاطه باغشيه ملساء مرصوفه بعضها فوق الآخر ويكثر في الخلايا الافرازية (الغدد اللعابيه والبنكرياس) له تركيب قنوى مع وجود اكياس ذات احجام مختلفه واغشيه ملساء لعدم احتوائه على الرابيوسومات ، ان جهاز كولجي مختلف في التكوين فهو صغير الحجم في الاليف العضليه وكبير في الخلايا ذات الفعاليه الافرازية و يحوى على نسبة عاليه من الليبيات والليبيات البروتينيه وعدد قليل من الانزيمات ولكنها يفتقر الى الاحماض النوويه . تظهر اجسام كولجي على شكل حويصلات مضغوطة في وسطها وتتصل مع بعضها بواسطه خيوط تسمى الخيوط الشبكية واهم وظائفها تكوين الانزيمات والهرمونات وتساعد في افراز وتخليق السكريات خاصه التي تتحد مع بروتينات الخلية .

الجسم المركزي (centriole)

يوجد في جميع انواع الخلايا قطره (0.2) مايكرومتر لا يرى الاثناء الانقسام حيث ينقسم الى نصفين يتوجه كل منها الى احدقطبى الخلية وهو عباره عن اسطوانه قصيره لها تركيب مشابه للاهداب من حيث التركيب مدعوم ب (9) ازواج من الاليف المزدوجه وللجسم المركزي تاثير فى تحرك الكروموسومات نحو نصف الخلية اثناء انقسامها ولا يوجد فى معظم الخلايا النباتيه ويظهر تحت المجهر على شكل جسم كروي صغير قرب النواه .

المحتويات الغير حية

المحتويات غير الحية في السيتوبلازم Cell inclusions

وتشمل المواد التي تتكون في السيتوبلازم نتيجة الفعاليات الحيوية للخلية وهي مواد مختلفه وقد تكون بشكل حبيبات او بلورات و مواد غير حية توجد بشكل اجسام صلبه او شبهه صلبه او دهنیه ومن هذه المواد اياتي :

الحبيبات النشوئية glycogen

هي مواد كربوهيدراتيه مخزونه فى النباتات وهناك مواد كربوهيدراتيه اخرى مخزونه فى الخلايا الحيوانيه يطلق عليها النشا الحيواني (الكلاكوجين)

كما تكون مخزونه فى الكبد والخلايا العضلية .

الحبيبات الصبغية (Melanin)

وهي تراكيب حبيبيه يعزى لها تلون الجلد والشعر والعيون في الفقريات كما توجد في خلايا النباتات .

القطيرات الزيتية

توجد في الخلايا الدهنيه بشكل زيوت طياره او دهنیه ثابتة تستخد كاحتياطي للطاقة ، والزيوت الطياره يعزى اليها الروائح العطره للورد والليمون وغيرها كالمواد المخاطيه (Mucus) التي توجد في الخلايا التي تبطن جهاز الهضم والتنفس و تعمل على حمايه وتلبيه ممرات هذين الجهازين .

البلورات

توجد بعض املاح المواد اللاعضويه متربه في سايتوبلازم بعض الخلايا بشكل بلورات وبعضها يتخذ اشكالا هندسيه ثابتة كالبلورات القضيبية والنجميه .

الفجوات الخلوية vacuoles

وهي عباره عن فجوات صغيره تحتوى على العصير الخلوي الذي يتراكب من الاملاح المعدنيه والمواد السكريه وبعض الاحماض العضويه و مواد دهنیه وبروتينيه ذاتيه و مواد صبغيه ولهذا فان الفجوات الخلويه يمكن اعتبارها مخازن مؤقته لتجمع النفايات الخلويه .